



**Indications:** The CLIP is prescribed post-ulceration of the plaque denture and to tartar on the implants dentures and restorations prothétiques. Son utilisation est limitée aux patients qualifiés (denturiers-dentistes, hygiénistes). Il s'agit exclusivement des inserts de détachage Scopicon et il permet un nettoyage sans abrasion des surfaces fragiles lors d'une étape de détartrage.

**Fixation du CLIP sur l'inser:** Insérer le point de insertion sur un CLIP présent sur 1 des 5 emplacements du CLIPPER (fig. 1). Appliquer une forte pression (minimum 3 kg) pour assurer la bonne fixation du CLIP sur l'inser (fig. 2). Retirer l'ensemble du CLIPPER et vérifier manuellement la bonne fixation du CLIP.

**Nettoyage des implants et restaurations (fig. 3):** Répéter la puissance de force générée d'ultrasons à 20% maximum (mode pneumatique) pour les poser à 60° maximum. Utiliser un abat-dérivation unique. Travaillez sans aspiration pour éviter une ingestion ou inhalation accidentelle de débris par le patient. Laissez travailler le CLIP jusqu'à ce qu'il soit à l'artose sans excès de pression.

**Retrait du CLIP:** Placez l'inser et le CLIP dans l'emplacement de retrait situé à l'extrémité du CLIPPER (fig. 4). Visualiser l'état d'usure du CLIP grâce à la ligne témoin (fig.5 et 6). Retirer le CLIP de l'inser et exécuter une pression du poise sur le CLIPPER (fig.6).

**Entretien - Nettoyage - Stérilisation:** Les CLIPs, comme les inserts, sont fournis non stériles et doivent être désinfectés, nettoyés et stérilisés avant chaque utilisation. N'utilisez que des solutions ayant une efficacité reconnue pour le nettoyage et la désinfection des instruments (par ex. agent nettoyant DGHM, FDA on masqueur CE). 1) immédiatement après l'acte avial, immerger dans un bain de décontamination selon les prescriptions du fabricant (concentration, temps, température). Un bain d'ultrasons peut également être utilisé. 2) Retirer l'inser à l'eau courante jusqu'à diminution des débris visibles et des restes de produit de désinfection. 3) Laver manuellement à l'aide d'une brosse douce et d'une solution nettoyante selon les prescriptions du fabricant (concentration, temps, température). 4) Rincer abondamment à l'eau courante jusqu'à diminution des salissures visibles et des restes de produit de nettoyage. 5) Sécher avec un tissu doux et non pelucheux ou à l'air comprimé libre. 6) Vérifier visuellement l'absence de résidus. 7) Placer dans un conditionnement approprié à la stérilisation des dispositifs médicaux selon les normes ISO 11607 - EN 868. 8) Stériliser à l'autoclave (stérilisation à la vapeur d'eau saturée humide) à une température de 134 °C pendant 18 minutes.

**Elimination:** La longévité du CLIP dépend de l'usage et des dommages subrevenus lors de l'utilisation. A éliminer selon la réglementation en vigueur sur les déchets à risques infectieux. **Important:** Le CLIP est conçu pour s'adapter et se fixer exclusivement sur les inserts Scopicon de la gamme i.FSA, IEM, ISI, I.KP, I.KA, I.AIR, I.AIRW, I.LM. L'utilisation du CLIP sur un autre insert expose à propoiver sa désolidarisation lors de l'utilisation. Seul l'usage du CLIPPER permet une fixation optimale et sécurisée du CLIP. Ne pas tenter de fixer un CLIP sur un insert sans utiliser le CLIPPER. L'emploi et l'application du produit font l'objet de la responsabilité de l'utilisateur. Scopicon décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation.

**Indications:** The CLIP is indicated for the elimination of the plaque and tartar on dental implants and restorations. The use is restricted to competent and qualified practitioners (dentist surgeons, hygienists). It is designed to work exclusively with the Scopicon i ultrasonic tip and prevents cleaning without damaging the fragile surface during scaling.

**Fixing the CLIP onto the inser:** Place the tip of the scaler into one of the CLIPs in the CLIPPER (fig. 1). Press the tip firmly into the CLIP (minimum 3 kg) to ensure good fixation (fig. 2). Remove the insert with the CLIP attached and manually check that the CLIP is securely fixed.

**Cleaning implants and restorations (fig. 3):** Repeat the power setting on the ultrasonic generator is set from (minimum) to 20% max (pneumatology), or Stage 1 for pneumatic handpieces. Set the water spray to a medium setting. When scaling, work with aspiration to ensure that your patient does not swallow any debris and ensure that the CLIP is pushed to the surface being cleaned. Do not press the CLIP against the surface.

**To remove the CLIP:** Place the tip with the CLIP into the groove at the end of the CLIPPER (fig. 4). Visualize if the CLIP is worn thanks to the witness line (fig. 5 and 6). The CLIP can be removed from the tip by pulling hard against the wear guide at the side of the CLIPPER (fig. 6).

**Disinfection - Cleaning - Sterilization:** The CLIPs, as well as the tips, are supplied non-sterile and must be disinfected, cleaned and sterilized before each use. Only use solutions with proven efficacy for cleaning and disinfection of instruments (eg. DGHM, FDA or CE marked). 1) Immediately after the restorative procedure, immerse in a decontamination bath according to the manufacturer's instructions (concentration, time, temperature). An ultrasonic bath may also be used. 2) Clean with running water until free of visible debris and disinfected residues. 3) Wash manually using a soft brush and a cleaning solution according to the manufacturer's instructions (concentration, time, temperature). 4) Rinse thoroughly with running water to remove viable dirt and cleaning product residues. 5) Dry with a soft dry tissue or with filtered compressed air. 6) Visually check for dirt. 7) Place in proper packaging for medical device sterilization according to ISO 11607 - EN 868. 8) Sterilize using autoclave (steam sterilization) at the temperature of 134°C for 18 minutes.

**Elimination:** The CLIP is designed to work exclusively with Scopicon i-insets (i.FSA, IEM, ISI, I.KP, I.KA, I.AIR, I.AIRW, I.LM). Using the CLIP with any other tips will result in the CLIP falling off when in use. When using the CLIP to the tip only use the CLIPPER to ensure secure fixation. Do not try to fix a CLIP to the tip without the CLIPPER for example by hand. The correct use and application of the CLIP is the responsibility of the user. Scopicon does not accept any responsibility in any case of misuse.

**Indications:** Der CLIP wurde für die schonende und sichere Entfernung von Plaque und Zahnstein auf Zahnimplantaten und prothetischen Versorgungen entworfen. Der Gebrauch ist nur qualifizierten Anwendern vorbehalten (Chirurgen, Hygienisten, etc.). Der Scalantippen ermöglicht die Reinigung empfindlicher Oberflächen aus Titan ohne Beschädigung und funktioniert ausschließlich mit Scopicon i-Ultraschallköpfen.

**Befestigung des CLIP auf den Ultraschallkopf:** Stecken Sie die Scopicon i-Insets in eines der CLIPs in des CLIPPER (Abb. 1). Drücken Sie die Spitze fest in ein CLIP (mindestens 3 kg Anpressdruck), um eine optimale Fixierung zu gewährleisten (Abb. 2). Nehmen Sie den Einsatz-Instrument und prüfen Sie manuell ob der CLIP sicher befestigt ist.

**Reinigung von Zahnimplantaten und Restaurationen (Abb.3):** Wiederholen Sie die Leistungseinstellung des Ultraschallkopfes max.20% (Pneumatologie) / Einstellungs-1 am pneumatischen Handstück. Stellen Sie den Wasserstrahl auf ein mittleres Niveau ein. Arbeiten Sie beim Scaling mit Spülbehälterhaltung und Aspirationsdruck, damit der Patient sich nicht verschluckt. Stellen Sie beim Scaling sicher, dass der CLIP immer parallel zu den zu reinigenden Oberfläche angebracht ist. Drücken Sie den CLIP nicht auf die Zahnoberfläche.

**Entfernen des CLIPs:** Stecken Sie die Spitze mit dem CLIP in die Nut am Ende des CLIPPERs (Abb.4). Überprüfen Sie anhand der Abnutzungs-Profile, wie weit der CLIP abgenutzt wurde. (Abb.5 und 6). Der CLIP kann durch festes Ziehen am des Führung an der Seite des CLIPPER von dem Spitze entfernt werden (Abb.6).

**Desinfektion - Reinigung - Sterilisation:** Die CLIPs sind nicht in der Anwendung steril oder antiseptisch versipakt und müssen daher vor jedem Gebrauch desinfiziert, gereinigt und sterilisiert werden. Benutzen Sie nur die hierzu angegebenen Desinfektionslösungen, die für die Reinigung und Desinfektion von Instrumenten eine anerkannt geeignete Wirkstoff wirksam (z.B. DGHM, FDA, GWS/Grünigut oder CE-Kennzeichnung) 1) Nach anvisieren und intrinsischer Anwendung sofort den Aufsatz in einem Dekontaminationsbad nach Anleitung und Hinweis des Herstellers einlegen (Konzentration, Zeit, Temperatur). Ein Ultraschall-Bad kann hierbei ebenfalls verwendet werden. 2) Spülen Sie unter fließendem Wasser gründlich bis die sichtbarste Benetzung von Kochsalzlösung, Desinfektionsmittel, Bleich- und Abblaugung zu erkennen ist. 3) Waschen Sie von Hand mit einer weichen Bürste und einer Reinigungslösung gemäß den Empfehlungen des Herstellers (Konzentration, Zeit, Temperatur). 4) Spülen Sie mit reichlich Wasser ab und schütten Schmutzwasser und Resten von Desinfektionsmittel ab. 5) Trocknen Sie mit einem weichen, faserfreien Tuch oder gelblicher Drehwoll gut ab. 6) Prüfen Sie visuell, ob Spürten vorhanden sind. 7) Stellen Sie in einer Verpackung, die für die Sterilisation des medizinischen Verbrauchsmaterials gemäß ISO 11607 - EN 868 (Neuer) geeignet ist. 8) Sterilisieren Sie in Autoklav (Dampfsterilisation - feuchte Hitze) im Temperaturbereich von 134° innerhalb 18 Minuten.

**Entsorgung:** Die Lebensdauer des CLIPs hängt von der jeweiligen Nutzungsform ab. Entsorgen Sie den CLIP nach den Anweisungen von Behälter mit medizinische Abfälle mit Infektionsrisiko. **Wichtige Hinweise:** Der CLIP ausschließlich für die Arbeit mit Scopicon i-Einstätzen (i.FSA, IEM, ISI, I.KP, I.KA, I.AIR, I.AIRW, I.LM) vorgesehen. Sollten Sie den CLIP auf anderen System verwenden, kann sich der CLIP während des Einsatzes lösen. Nur durch eine Befestigung des CLIPs an Hilfe des CLIPPER an die Spitze kann eine sichere Befestigung gewährleistet werden. Versuchen Sie nicht einen CLIP ohne CLIPPER, beispielsweise von Hand zu befestigen. Die richtige Nutzung und Anwendung des CLIPs liegt in der Verantwortung des Benutzers. Der Hersteller übernimmt bei missbräuchlicher Gebrauch keine Verantwortung.

**Indications:** El CLIP es un dispositivo para la eliminación del sarro dental en los implantes y restauraciones prothéticas. La CLIP es indicada para los operadores expertos y cualificados (dentistas dentistas, higienistas). El se adapta exclusivamente en los insertos de detartraje Scopicon i permitiendo una limpieza sin abrasión de las superficies fragiles en el momento del desmenuz.

**Fixación del CLIP en el inserto:** Inserte la punta del inserto en el CLIP que tiene 5 emplazamientos en el CLIPPER (fig. 1). Hacer una fuerza presión (mínimo 3 kg) para asegurar una buena fijación en el inserto (fig. 2). Retirar el conjunto del CLIPPER y verificar manualmente la buena fijación del CLIP.

**Limpieza de los implantes y restauraciones (fig. 3):** Repetir la potencia del generador del ultrasonido a 20% máximo (modo paradosia) e conseguir 1 por parte de mano pneumática. Utilizar un abatidor con aspirador para evitar cualquier ingestión o inhalación accidental. Durante trabajos de CLIP paralelamente de la superficie a limpiar sin ejercer ninguna presión.

**Retirada del CLIP:** Coloque el inserto en el CLIP en la hendidura situada en la extremidad del CLIPPER (fig. 4). Visualizar el desgaste del CLIP gracias a una línea de marca indicada de uso (fig. 5 y 6). El CLIP se puede retirar de la punta del implante tirando del lado del CLIPPER (fig. 6).

**Desinfección - Limpieza - Esterilización:** Los CLIPs, como los insertos, que se abastecen con no-sterile e desinfectar, limpiar y esterilizar antes cada utilización. Solo utilizar soluciones con probada eficacia para la limpieza y desinfección de instrumentos (por ejemplo DGHM, FDA o marcado CE). 1) Inmediatamente después del procedimiento operatorio, sumergir el dispositivo en un baño de descontaminación de acuerdo con las instrucciones del fabricante (concentración, tiempo, temperatura). Un baño de ultrasonidos también puede ser utilizado. 2) Limpiar el aparato con agua corriente hasta que quede libre de residuos de suciedad y desinfectantes visibles. 3) Lavar el dispositivo manualmente usando un cepillo suave y una solución de limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante (concentración, tiempo, temperatura). 4) Enjuagarse con un agua corriente hasta que no quede visible el producto. 5) Secar el dispositivo con un tejido suave y un peloso o con un compungido filtrado. 6) Comprobar visivamente si hay suciedad. 7) Colocar el dispositivo en un embalaje adecuado para los dispositivos médicos de esterilización de acuerdo con la norma ISO 11607 - EN 868. 8) Esterilizar el dispositivo mediante autoclave (esterilización con vapor) a la temperatura de 134 °C durante 18 minutos.

**Elimination:** La longevidad del CLIP depende del uso y de los daños causados durante su utilización. Residuo según la legislación en vigor como desecho de tiempo infestado. **Importante:** El CLIP está diseñado para adaptarse y fijarse exclusivamente en los Insertos Scopicon i de la gama (i.FSA, IEM, ISI, I.KP, I.KA, I.AIR, I.AIRW, I.LM). La utilización del CLIP en otro inserto genera o provoca su desolidarización durante su utilización. Solo el uso del CLIPPER garantiza un fujamento optimo y seguro del CLIP. No intentar fjar un CLIP en un inserto sin utilizar el CLIPPER. El empleo y utilización de este producto hacen el objeto de la responsabilidad del usuario. Scopicon declina toda responsabilidad en caso de una mala utilización.

**Indications:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat a personal qualificat i a procediments específics (dentistes, higienistes). S'aplica exclusivament en inserts ultrasons Scopicon i permetent l'eliminació de la placa sense risc de danegament de les fragils superfícies dentals. L'ablicació de la CLIP requereix l'ús exclusiu dels caps d'ultrasons Scopicon i. **Indicaciones:** La CLIP i indica per l'eliminació de la placa i del tartar als implants dentals i restants protèsics. L'ús està limitat